2.6. Kohlenhydrate

Die Kohlenhydrate (KH) bilden eine im Pflanzen- und Tierreich weit verbreitete Stoffklasse von Naturstoffen.

Aufgrund ihrer allgemeinen Summenformel $C_x(H_2O)_y$ wurden sie früher als Hydrate des Kohlenstoffs aufgefasst.

Einteilung

Monosaccharide: *KH, die durch Hydrolyse nicht mehr in einfachere Moleküle gespalten werden können.*

Oligosaccharide: *KH, die aus zwei bis acht Monosaccharid Bausteinen aufgebaut sind.*

Polysaccharide: *KH, die durch Polykondensation von mehr als acht Monosacchariden aufgebaut werden.*

Monosaccharide

Monosaccharide sind aliphatische, geradkettige Polyhydroxyaldehyde oder -ketone mit 3 ~ 6 C-Atomen.

Nomenklatur

Monosaccharide werden zu den Zuckern gerechnet und meist mit Trivialnamen bezeichnet.

Je nach der Anzahl der Kohlenstoffatome in der Kette unterscheidet man Triosen, Tetrosen, Pentosen und Hexosen. Monosaccharide mit einer endständigen Carbonylgruppe werden auch als Aldosen, die andern als Ketosen bezeichnet. Es sind auch kombinierte Bezeichnungen üblich.

In der weniger üblichen systematischen Namengebung werden die Monosaccharide als Hydroxyaldehyde oder -ketone bezeichnet. Die Numerierung der Kette erfolgt so, dass das C-Atom der Carbonylgruppe eine möglichst tiefe Ziffer erhält.

Glycerinaldehyd, Aldotriose
2,3-Dihydroxypropanal

Fructose, Ketohehexose
1,3,4,5,6-Pentahydroxy-2-hexanon

Struktur

Die KH treten sowohl kettenförmig als auch in der cyclischen Halbacetal oder Halbketalform auf. In Lösung stehen beide Formen im Gleichgewicht.

Die offenkettige Form wird meist in der **Fischer-Projektion** dargestellt. Die Kette verläuft von oben nach unten. Die horizontalen Bindungen ragen aus der Papierebene nach vorn, die vertikalen nach hinten. **D-Saccharide** weisen am chiralen C-Atom mit der grössten Ziffer diese Konfiguration auf wie D-Glycerinaldehyd, d.h. sie tragen die OH-Gruppe rechts. **L-Saccharide** haben an diesem C-Atom eine spiegelbildliche räumliche Struktur.

D-Glycerinaldehyd

D-Fructose

L-Fructose

D-Sorbose

Die cyclischen Formen stellt man entweder sterisch richtig als Sesselform oder in der weit verbreiteten **Haworth-Projektion** dar. Die cyclische Form hat gegenüber der kettenförmigen ein chirales C-Atom mehr. Die beiden Isomeren werden als Anomeren bezeichnet und mit α und β unterschieden.

α -D-Glucose

β -D-Glucose

wichtige Vertreter

Die natürlichen, optisch aktiven Zucker werden ausschliesslich mittels Trivialnamen bezeichnet. Oft werden die Symbole der Konfiguration (D- oder L-Konfiguration) und des optischen Drehsinns ((+) oder (-)) vorangestellt.

Desoxyribose

Desoxyribose ist eine *Aldopentose*.

Sie ist Baustein der Desoxyribonucleinsäure, aus denen sich die Gene der Chromosomen zusammensetzen.

D-Glucose

D-Glucose ist Traubenzucker und die in der Natur am weitesten verbreitete *Aldohexose*.

Sie kommt frei vor in Früchten und Honig.

Im Blattgrün der Pflanzen entsteht Glucose durch Photosynthese.

Sie ist der monomere Baustein der Polysaccharide

Stärke und Cellulose.

D-Fructose

D-Fructose oder Fruchtzucker ist die wichtigste natürliche *Ketohexose*.

In Pflanzen, in süßen, überreifen Früchten kommt sie frei vor, gebunden ist sie mit D-Glucose ein Bestandteil des

Rohrzuckers.

Eigenschaften

Monosaccharide sind optisch aktive, polare, hydrophile, weisse und kristalline Verbindungen von süßem Geschmack.

Sie sind gut wasserlöslich, dagegen schlecht in organischen Lösungsmitteln.

Die vielen hydrophilen OH- und C=O-Gruppen überwiegen gegenüber dem lipophilen KW-Rest.

Reaktionen**Halbacetalbildung**

Aldehyde reagieren mit Alkoholen säurekatalysiert zu Halbacetalen. Aldosen, die beide funktionellen Gruppen aufweisen, neigen zur intramolekularen Halbacetalbildung

Der Ringschluss von der offenen **Oxoform** in die tautomere cyclische Halbacetalform,

Lactolform genannt, erfolgt bei der Glucose durch Addition der alkoholischen OH-Gruppe am C₅ an die C=O-Doppelbindung der Carbonylgruppe.

In kristallisiertem Zustand liegt Glucose ausschliesslich in der Ringform vor. In wässrigen Lösungen stellt sich ein stark auf der Seite der Lactolform liegendes Gleichgewicht ein.

Halbketalbildung

Die Keto-hexosen sind zur intramolekularen Halbketalbildung befähigt. Je nach Ringgrösse des Heterocyclus unterscheidet man zwischen **Furanosen** und **Pyranosen**.

Glycosidbildung

In Zuckern sind die OH-Gruppen der Halbacetale und Halbketale besonders reaktiv. Sie kondensieren mit Alkoholen unter Wasserabspaltung zu Acetalen und Ketalen, den sogenannten **Glycosiden**.

Die Glycosidbildung ist auch zwischen Monosacchariden möglich. Dabei entstehen die Oligo- und Polysaccharide.

reduzierende Wirkung

Aldosen und Ketosen reduzieren Fehling'sche Lösung zu rotem Kupfer(I)-oxid, wobei im alkalischen Medium die Ketosen zuerst zu den tautomeren Aldosen umlagern.

Disaccharide

Disaccharide bestehen aus zwei kondensierten Monosaccharid-Molekülen.

wichtige Vertreter

Saccharose

Das wichtigste Disaccharid ist die Saccharose (Rohr- oder Rübenzucker), der im Alltag verwendete Zucker.

Die großtechnische Gewinnung erfolgt durch Auspressen des Zuckerrohrs und durch Extrahieren der Zuckerrüben.

Saccharose ist das **1,2-Glycosid** aus Glucose und Fructose.

Maltose

Maltose (Malzzucker) wird aus keimender Gerste gewonnen.

Sie ist ein **1,4-Glycosid** aus zwei Glucosemolekülen und entsteht beim Abbau von Stärke.

Reaktionen

Hydrolyse

Disaccharide hydrolysieren in saurer Lösung in ihre beiden Monosaccharid-Bausteine. Sie werden in biochemischen Abbauvorgängen durch Mikroorganismen (Fermente) gespalten.

reduzierende Wirkung

Verantwortlich für die reduzierenden Eigenschaften von Disacchariden ist die Art der Glycosid-Bindung.

Maltose wirkt reduzierend:

Sie besitzt noch eine freie Halbacetalgruppe, die im tautomeren Gleichgewicht mit der Oxoform steht.

Saccharose wirkt nicht reduzierend:

Beide Carbonylgruppen sind durch die Glycosid-Bindung blockiert.

Polysaccharide

Polysaccharide sind Polykondensationsprodukte aus Monosacchariden.

wichtige Vertreter

Stärke

Stärke ist ein weisses, geruch- und geschackloses Pulver. Sie ist ein wichtiger Naturstoff. Sie bildet sich nach der Fotosynthese in den Blättern aus Glucose und wird als Reservestoff in Samen, Knollen und Früchten der Pflanze gespeichert.

Stärkemoleküle weisen 600 bis 900 Glucose-Einheiten auf, die durch eine α -ständige 1,4-Glycosid-Bindung verknüpft sind.

In kaltem Wasser ist Stärke praktisch unlöslich, in heissem Wasser quillt sie auf und erstarrt gelatinös.

Eine kalte, kolloidale wässrige Stärkelösung bildet mit Iod eine blauviolett gefärbte Einchluss-verbindung (Nachweis).

Cellulose

Cellulose ist der Gerüststoff der Pflanzen. Sie ist wie die Stärke aus Glucose-Bausteinen auf-gebaut, die aber durch eine β -ständige Glycosid-Bindung verknüpft sind. Trotz dieses kleinen Unterschiedes hat sie ganz verschiedene Eigenschaften gegenüber der Stärke.

Die Cellulose besitzt Faserstruktur. Die meiste Cellulose wird aus Holz gewonnen. Fast reine Cellulose findet man in der Baumwolle, im Hanf und im Flachs.

Der menschliche Organismus kann Cellulose (im Gegensatz zu Stärke) mangels geeigneter Enzyme nicht spalten.